

Tytuł: Wybrane problemy z zakresu ginekologii dziecięcej i dziewczęcej / Selected issues on pediatric and adolescent gynecology

Słowa kluczowe: KRWAWIENIA MŁODOCIANYCH ZABURZENIA MIESIŹCZKOWANIA ADOLESCENCJA INFEKCJE NARZĘDU RODNEGO

Keywords: JUVENILE BLEEDING MENSTRUAL DISORDERS ADOLESCENCE GYNECOLOGICAL INFECTIONS

Autorzy:

Dominika Sajdak - Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Agata Sidor-Stawowy - Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Violetta Skrzypulec-Plinta - Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny

Agnieszka Białyka - Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Agnieszka Droszól-Cop - Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie:

Nastolatki i dziewczynki stanowią zdecydowanie mniejszą w grupie pacjentek leczonych przez ginekologów. Opieka nad dzieckiem, nastolatką różni się pod względem od pracy z dorosłą kobietą. Infekcje narządów płciowych stanowią jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w poradni ginekologicznej dla dziewcząt, szczególnie pomiędzy 3 a 10 rokiem życia. Zaburzenia miesiączkowania mogą dotyczyć nawet 75% populacji nastolatek. Najczęstszymi przyczynami wtórnego braku miesiączki (50-75%) są czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego oraz zaburzenia miesiączkowania związane z hiperandrogenizacją – zespół policystycznych jajników. W diagnostyce zaburzeń miesiączkowania należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki związane ze stresem, z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, utratą masy ciała, a także na zaburzenia o podłożu psychicznym: anorexia nervosa lub bulimia nervosa.

U 20-30% nastolatek w okresie adolescencji diagnozuje się krwawienia młodocianych. Określa się je jako obfite krwawienia z jamy macicy ze skrzepami, często trwające ponad 10 dni, z utratą krwi powyżej 80 ml, bez związku z innymi patologiami narządu rodowego.

Abstract:

Teenage and young girls comprise the vast minority of patients treated by gynecologists. Treatment and care of a child or teenage girl varies in every respect from that of an adult woman. Genital infections form one of the most common reasons for visits to gynecological clinics for girls, especially between the ages of 3-10 years. Menstrual disorders may affect up to 75% of the teenage population. The most common reason for secondary amenorrhea (50-75%) is functional hypothalamic amenorrhea and menstrual disorders related to hyperandrogenism – polycystic ovary syndrome. Stress, excessive exercise, weight loss, and psychiatric disorders (Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa) compose some of the most important factors in diagnosing

menstrual disorders. Juvenile bleeding – defined as profuse uterine bleeding with blood clots, often lasting more than 10 days, blood loss greater than 80 ml, without any relation to other gynecological pathologies – is diagnosed in 20-30% of teenagers in adolescence.