

Tytuł: Polipowatość młodoziecza niemowląt jako ciężka postać zespołu polipowatości młodozieczej. /
Juvenile polyposis of infancy as a severe form of juvenile polyposis syndrom.

Słowa kluczowe: diagnostyka leczenie niemowlęta polipowatość młodoziecza

Keywords: diagnosis infants treatment juvenile polyposis syndrom

Autorzy:

Krzysztof Fyderek - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków

Elżbieta Budzyńska - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Andrzej Władychowicz - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Streszczenie:

Polipowatość młodoziecza niemowląt (ang. juvenile polyposis of infancy) jest jedną z trzech postaci zespołu polipowatości młodozieczej. Stanowi jego najcięższą postać o złym rokowaniu i dotyczy niemowląt i dzieci do 2. r.ż. Do tej pory opisano tylko nieliczne przypadki pacjentów z polipowatością młodozieczą niemowląt. Objawy kliniczne choroby są bardzo nasilone i występują już od pierwszych miesięcy życia, obejmując objawy ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia rozwoju fizycznego oraz objawy ze strony innych narządów. Nasilenie objawów klinicznych jest odzwierciedleniem stopnia zajęcia przewodu pokarmowego przez polipy młodoziecze. W niniejszej pracy przedstawiono etiopatogenezę, obraz kliniczny, diagnostykę, leczenie oraz rokowanie w zespole polipowatości młodozieczej z szczególnym uwzględnieniem polipowatości młodozieczej niemowląt.

Abstract:

Juvenile polyposis of infancy is one of the three forms of juvenile polyposis syndrom. It is the most severe form of juvenile polyposis syndrom with poor prognosis, affecting infants and children below 2 years of age. Only a few cases of juvenile polyposis of infancy were reported up to now. Clinical symptoms occur in first months of life, including gastrointestinal symptoms, failure to thrive and symptoms from other organs. Clinical presentation of the disease reflects the involvement of the gastrointestinal tract by polyps. The etiopathogenesis, clinical presentation, diagnosis, treatment and prognosis in juvenile polyposis syndrom, especially in juvenile polyposis of infancy were reviewed in this article.