

Tytuł: Wprowadzanie glutenu a ryzyko wystąpienia celiakii - aktualności i kontrowersje / Introduction of gluten and the risk of celiac disease - current controversies

Słowa kluczowe: DZIECI GLUTEN WYWIENIE CELIAKIA

Keywords: CHILDREN GLUTEN NUTRITION CELIAC DISEASE

Autorzy:

Piotr Buda - <p>Klinika Pediatrii, Wyżwienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p></p>

Anna Chmielewska - Department of Clinical Sciences, Pediatrics, Umeå University, Sweden Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Janusz B. Księżyk - <p>Klinika Pediatrii Wyżwienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa</p><p></p>

Hanna Szajewska - <p>Klinika Gastroenterologii i Wyżwienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego</p><p>Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego</p>

Streszczenie:

Według aktualnych zaleceń towarzystw gastroenterologicznych gluten należy wprowadzać do diety dziecka w wieku 4-6 miesięcy. Wyniki najnowszych, opublikowanych w 2014 roku, badań z randomizacją wskazują, że taka strategia nie zmniejsza ryzyka wystąpienia celiakii, jak wcześniej twierdzono. Wnioski płynące z tych badań wskazują na konieczność modyfikacji dotychczasowych zaleceń opartych jedynie na badaniach obserwacyjnych.

Abstract:

Currently, pediatric gastroenterology societies recommend gluten introduction at the age of 4 to 6 months. The results of two randomized controlled trials published in 2014 suggest that such strategy does not reduce the risk of celiac disease, as previously postulated. The conclusions of these trials indicate the need to modify existing recommendations based solely on observational studies. Standardy